


Perjalanan infeksi HIV



Tertular HIV
0

Periode Jendela*

2 minggu-6 bulan
(3 bulan pada 95% kasus)

HIV Positif
3-10 tahun

AIDS
1-2 tahun

* Masa antara masuknya HIV kedalam tubuh manusia sampai terbentuknya antibody terhadap HIV atau disebut juga HIV positif. Sudah bisa menularkan HIV kepada orang lain.

- Tanpa gejala, tampak sehat.
- Dapat beraktivitas biasa.

- **Timbul infeksi oportunistik:** Infeksi yang tidak berbahaya pada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal tapi dapat berakibat fatal pada orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah akibat diserang HIV.

HIV

AIDS

Human Immunodeficiency Virus

Virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia.

Acquired Immune Deficiency Syndrome

Sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV.

HIV menular melalui:



- Menggunakan jarum suntik:
- secara bergantian
 - bekas pakai
 - tidak steril
 - Transfusi darah



Hubungan seks berganti-ganti pasangan



- Dari ibu ke bayi melalui proses:
- hamil
 - melahirkan
 - menyusui

HIV tidak menular melalui:



Gigitan nyamuk atau serangga lain



Bersalaman, pelukan ataupun ciuman



Berenang bersama



Terpapar batuk atau bersin



Memakai toilet bersama



Berbagi makanan atau menggunakan alat makan bersama

